


1.4. Mortalité prématurée

Taux comparatif de mortalité prématurée par espace de santé de proximité sur la période 2008-2012



La mortalité prématurée (c'est-à-dire survenant avant l'âge de 65 ans) constitue un puissant marqueur d'inégalités sociales de santé et de genre, car elle est très inégalement répartie entre les catégories sociales et entre hommes et femmes.

Le taux comparatif de mortalité prématurée¹ en Paca (145 décès prématurés pour 100 000 habitants) est inférieur à celui observé en France métropolitaine (152 pour 100 000 habitants) sur la période 2008-2012. Cependant, celui-ci varie notablement selon les espaces de santé de proximité de la région, soulignant les inégalités territoriales de santé en Paca. La mortalité prématurée apparaît élevée dans certaines zones situées aux extrémités ouest et est de la région mais aussi dans certaines zones de l'arrière-pays entre Barcelonnette et Draguignan (espaces de santé de proximité de Castellane, Figanières, Saint-André-les-Alpes...) ainsi que dans les arrondissements du nord et du centre de Marseille. Dans la région Paca, la mortalité prématurée a régulièrement diminué entre 2000-2004 et 2008-2012, de 169 décès pour 100 000 habitants à 145 décès pour 100 000 habitants.

En Paca, chaque année, plus de 8 000 décès surviennent avant 65 ans dont deux tiers parmi les hommes. En 2012, en Paca comme en France métropolitaine, les trois principales causes de mortalité prématurée étaient, par ordre décroissant, les cancers, les traumatismes et les maladies cardiovasculaires.

¹ Le taux comparatif de mortalité est le taux que l'on observerait dans la population étudiée si elle avait la même structure d'âge qu'une population de référence (population de la France métropolitaine).